



# Intoxication aux opioïdes présumée?

Procédez à un examen des lieux et veillez à ce que les lieux soient sécurisés, puis suivez les étapes **SAVE ME** :



## S - Stimuler

Criez son nom, tapez du pied, puis appelez le 911.



## A - Voies respiratoires

Enfilez vos gants et ouvrez les voies respiratoires. Inclinez la tête de la victime en plaçant une main sur son front, puis en soulevant son menton avec l'autre main.




## V - Insufflations

Utilisez un masque avec valve unidirectionnelle et donnez une insufflation toutes les cinq secondes en s'assurant que la poitrine se soulève, pour un total de 5 respirations.



## É - Évaluer

Les mesures sont-elles efficaces? Est-ce que la personne se réveille?



## M - Médicaments


Si la personne ne se réveille pas, administrez une dose de naloxone par voie nasale si vous avez reçu une formation à cet effet. Commencez la RCR pendant les 2 ou 3 prochaines minutes.



## É - Évaluer de nouveau

A) Si la victime commence à respirer, placez-la en position latérale de sécurité et continuez de la surveiller soigneusement en attendant l'arrivée du personnel paramédical.

B) Si la victime ne réagit pas, continuez la RCR. La naloxone devrait faire effet dans les deux à trois minutes. Sinon, administrez une autre dose de naloxone et continuez la RCR.



Lorsque la victime commence à respirer, placez-la en position latérale de sécurité et continuez de la surveiller soigneusement en attendant l'arrivée du personnel paramédical.

La naloxone neutralise temporairement les effets de l'intoxication aux opioïdes. Administrez une dose supplémentaire de naloxone si la personne entre à nouveau dans un état d'intoxication avant l'arrivée du personnel paramédical. Les effets de la naloxone ne durent que de 20 à 40 minutes. Surveillez la victime pour la présence de symptômes de surdose.